

دانشگاه علوم پزشکی جهرم  
بیمارستان خاتم الانبیاء خفر  
کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشکی

**فهرست داروهای خود به خود متوقف شونده (Automatic stop orders)**

داروهای خود به خود متوقف شونده به داروهایی گفته می شود که پس از مدت زمان معینی دیگر نباید ادامه یابند و باید به پزشک معالج اطلاع داده شود.

فهرست داروهایی که بعد از مدت معینی باید متوقف شوند:

ضد میکروبها (بجز داروهای موضعی) بعد از ۷ روز

ضد تشنج ها بعد از ۷۲ ساعت

کورتیکواستروئیدها (بجز داروهای موضعی) بعد از ۷ روز

داروهای ضد اضطراب و اختلالات روانی بعد از ۱۴ روز

داروهای خواب آور بعد از ۱۴ روز - مخدرها(بجز متادون) بعد از ۷ روز

محلولهای استنشاقی بوسیله نوبلاریزر بعد از ۷ روز

تمامی داروهای تغذیه ای غیر خوراکی بعد از ۷ روز

تنگ کننده عروق(چشمی و بینی) بعد از ۳ روز

NSAID و مهارکننده های COXII بعد از ۱۰ روز

کورتیکواستروئیدهای چشمی و خوراکی بعد از ۷ روز

ضد قارچ های موضعی بعد از ۳۰ روز

داروهایی که دستور مصرف آن ها در موقع الزام و ضرورت است در صورت عدم دستور جدید بعد از ۲۸ روز

کرمها ، پمادها و لوسیون های موضعی حاوی کورتیکواستروئیدها بعد از ۲۸ روز

مولتی ویتامین ها ، ضد اسیدها(ALMg - MgoH2) و استامینوفن بعد از ۳۰ روز

زمانی که بیمار به بخش جراحی انتقال می یابد تمامی داروها متوقف می شوند.